

Statisticas



Tendrá un ITS por la edad de 25 años

Cada persona sexualmente activa está en riesgo de ITS.

Más de **22,000** personas infectadas en Colorado*
HPV STI
gonorrea chlamydia
HIV

*CDC 2010

Jefferson County Public Health ofrece servicios a adolescentes, mujeres y hombres sin distinción de raza, religión, edad, origen nacional, género, orientación sexual o estado civil.

Todos los servicios son confidenciales.

Por favor llame para una cita.
303-239-7078



Salud Pública ... Todos los Días, en Todas Partes, para Todos

Jefferson County Public Health

303-232-6301
645 Parfet Street
Lakewood, CO 80215

jeffco.us/public-health

Marzo 2015



Clínica de ITS

Las Pruebas y el Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual



Jefferson County Public Health
303-239-7078
jeffco.us/public-health

Salud Pública ... Todos los Días, en Todas Partes, para Todos

¿Cuáles son las ITS?

- Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se transmiten por contacto sexual sin protección, a través de los líquidos del cuerpo o a veces pueden transmitir por contacto de piel a piel.
- Las ITS pueden ser contratados por oral, vaginal, y en el acto sexual ano y a veces por tocarse los genitales.
- Algunas ITS pueden transmitirse a los niños en el parto o por amamantando.
- Las infecciones pueden ser localizados en órganos reproductivos o puede ser generalizada en el cuerpo total.
- Las ITS no tratadas pueden causar consecuencias graves para la salud, especialmente para las mujeres jóvenes.

Prevención

- Evitar actividades sexuales es la mejor manera de evitar las ITS.
- Si usted tiene relaciones sexuales use condones cada vez para reducir el riesgo.
- Pregunte a su pareja si ha sido probado para las ITS. No tenga relaciones sexuales con alguien que pueden estar infectado.
- Hay vacunas disponibles para proteger contra algunas infecciones de transmisión sexual.
- Haga pruebas de ITS con regularidad.


Las visitas a la clínica son únicamente por cita.

Síntomas de ITS

Es importante recordar que muchas personas con una infección de transmisión sexual no tienen ningún síntoma.

Clamidia

Los síntomas pueden aparecer 7-28 días después de tener relaciones sexuales. Las mujeres pueden tener flujo vaginal o sangrado anormal, ardor o dolor al orinar. Los hombres pueden tener gotea por el pene blanco, dolor o ardor al orinar, testículos dolorosos o inflamados.



Herpes


En general, los síntomas aparecen dentro de 1-30 días después de tener relaciones sexuales. Puede tener síntomas como la gripe y pequeñas ampollas dolorosas en los órganos sexuales o en la boca. Ampollas duran de 1 a 3 semanas. Pueden desaparecer y puede reaparecer.

Virus de Papiloma Humano (VPH)

Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas pequeñas en los genitales y en el ano. Puede tener comezón con las verrugas. Las verrugas pueden desaparecer y puede reaparecer. Algunos tipos de VPH pueden causar cáncer de cuello uterino en las mujeres.

Gonorrea

Los síntomas pueden aparecer 2-21 días después de tener relaciones sexuales. Las mujeres pueden tener flujo vaginal espeso, amarillo, o gris. Períodos anormales y calambres abdominales. Los hombres pueden tener goteo de pene amarillo, o verde y los testículos inflamados o dolorosos.



EL VIH/SIDA

Puede estar presente para muchos años sin síntomas. Algunos síntomas son pérdida de peso inexplicable, cansancio, diarrea, síntomas como la gripe constantes, manchas blancas en la boca.

Hepatitis B

Los síntomas pueden aparecer 1-9 meses después contacto viral. Cansancio y síntomas como la gripe constantes. Con tiempo la piel puede parecerse amarillo y puede tener orina oscura.

Sífilis

La primera etapa: ampollas sin dolor en la boca o órganos sexuales que aparecen hasta 1-12 semanas después de tener relaciones sexuales y duran 2-6 semanas. Segunda etapa: salpullido en cualquier parte del cuerpo, síntomas como la gripe.

Enfermedad Pélvica Inflamatoria(EIP)

Las mujeres pueden tener dolor en la parte baja del abdomen, fiebre, dolor al orinar, y períodos irregulares. Puede tener un olor mal y el flujo vaginal puede ser un color anormal.

Tricomoniasis

Las mujeres pueden tener comezón, ardor o irritación en la vagina y flujo vaginal amarillo, gris o verdoso. Los hombres pueden tener goteo de pene aguado y blanco. También, pueden tener ardor o dolor al orinar y la necesidad de orinar con frecuencia.



Tratamiento

- Es muy importante de tratar cualquier ITS enseguida. Si no es tratada, algunas ITS pueden llevar a una infección más seria, causando infertilidad, cáncer, ceguera o la muerte.
- Muchas ITS pueden tratarse y curarse con antibióticos.
- Una persona infectada con una ITS debe informar a sus parejas sexuales para que también ellos pueden recibir tratamiento.

-El buscar tratamiento puede ser vergonzoso, pero es la única manera para mejorarse.